

AQ10^{WG}

Veiligheidskader

AQ10[®]

Voorzorgsmaatregelen:

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar nationale regelgeving.

Aanvullende etikettering:

SPO: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties uitlokken.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Antigifcentrum: 070 245 245

24u Noodnummer: 014 / 58 45 45

Meer informatie over dit product vindt u aan de binnenzijde van deze verpakking

Fungicide voor bestrijding van echte meeldauw in teelten onder bescherming.

Water dispergeerbaar granulaat (WG)
op basis van 5.0×10^9 CFU/g (58%)
Ampelomyces quisqualis AQ10.

Erkenningsnummer: 10314P/B

Inhoud: 30g 
Lotnummer en productiedatum:
zie verpakking.

Erkend en verdeeld door:



CBC (Europe) S.r.l.
Via E. Majorana 2
I-20834 Nova Milanese (MB)
Italië
Tel. (+39) 0362 365079
Fax (+39) 0362 41273

Distributeur:



HortiPro B.V.
Jagerserf 49
3851 SM Ermelo
Tel. (+31) 341 268 639
Nederland
www.hortipro.com

Consulter l'intérieur de l'enveloppe pour plus d'information sur le produit

24h Numéro d'urgence: 014 / 58 45 45

Centre Antipoisons : 070 245 245

du délai avant récolte.

n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans l'homme et l'environnement.

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour sensibilisation.

Les micro-organismes peuvent éventuellement provoquer des réactions de SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

pulvérisation ne soit complètement sec.

SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de

Informations supplémentaires:

P501: Éliminer le contenu/récipient dans réglementation nationale.

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence:

AQ10[®]

Cadre de sécurité

AQ10^{WG}

Fongicide pour la lutte contre l'oïdium en cultures sous protection.

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

contenant 5.0×10^9 CFU/g (58%)

Ampelomyces quisqualis AQ10.

Numéro d'agrément: 10314P/B

Contenu: 30g 

Numéro du lot et date de production:

voir emballage.

Agréé et distribué par:



HortiPro B.V.

Jagerserf 49
3851 SM Ermelo
Tel. (+31) 341 268 639
Les Pays Bas
www.hortipro.com

Mode d'emploi et doses d'utilisation

- Fraîsiers (sous protection): application préventive contre l'oidium (*Podosphaera aphanis*).
Dose: 70 g/ha; 2-12 applications à intervalle de 7-10 jours.
Max. 12 applications par culture.

- tomates, poivron/piment, aubergine et pépinos (sous protection): application préventive contre l'oidium (*Leveillula taurica*).
Dose: 35 g/ha de haie; 2-12 applications à intervalle de 7-10 jours.
Max. 12 applications par culture.

- courgette/pâtisson, cornichon et melon (sous protection): application préventive contre l'oidium (*Leveillula taurica*).
Dose: 70 g/ha (culture horizontale) ou 35 g/ha de haie (culture verticale); 2-12 applications à intervalle de 7-10 jours.
Max. 12 applications par culture.

- potiron (sous protection): application préventive contre l'oidium (*Leveillula taurica*).
Dose: 35 g/ha de haie; 2-12 applications à intervalle de 7-10 jours.
Max. 12 applications par culture.

Remarques
- Il est conseillé de vérifier la sélectivité du AQ 10® en procédant à un essai préliminaire sur un nombre limité de plantes avant d'effectuer le traitement à grande échelle. -selon la Réglement (CE) 834/2007, AQ 10® peut être utilisé en agriculture biologique.

Conseils de premiers secours
- **Après inhalation:** Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

- Après ingestion: Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

- Après contact avec le peau: Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussettes et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

- Après contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Remarques pour le médecin
Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons 070/245.245**

Lege verpakkingen en spuitoverschotten
De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Garantie:
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, de hantering, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport, het hanteren of het gebruik ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product. Bij twijfel of onduidelijkheid over de aangegeven gebruiksdoeleinden van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het aangewezen vooraf informatie bij ons in te winnen.

Opmerkingen:
Het is aangeraden eerst vast te stellen of het gewas het product kan verdragen door middel van een proefbespuiting op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Overeenkomstig de Verordening (EG) 834/2007 mag AQ 10® gebruikt worden in de biologische landbouw.

Aanwijzingen voor de eerste hulp
Na inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na inslikken: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na morsen op huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Na spatten in de ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **Het Antigifcentrum 070/245.245.**

Toepassingswijze en gebruiksdosissen
AQ 10® is een fungicide ter bestrijding van echte meeldauw in teelten onder bescherming.

- aardbeien (onder bescherming): ter preventieve bestrijding van echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*).
Dosering: 70 g/ha; 2-12 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.
Max. 12 toepassingen per teelt.

- tomaten, paprika/spaanse peper, aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming): ter preventieve bestrijding van echte meeldauw (*Leveillula taurica*).
Dosering: 35 g/ha haag; 2-12 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.
Max. 12 toepassingen per teelt.

- augurk, courgette/pâtisson en meloen (onder bescherming): ter preventieve bestrijding van echte meeldauw (*Leveillula taurica*).
Dosering: 70 g/ha (horizontale teelt) of 35 g/ha haag (verticale teelt); 2-12 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.
Max. 12 toepassingen per teelt.

- komkommer (onder bescherming): ter preventieve bestrijding van echte meeldauw (*Leveillula taurica*).
Dosering: 35 g/ha haag; 2-12 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.
Max. 12 toepassingen per teelt.

- pompoen (onder bescherming): ter preventieve bestrijding van echte meeldauw (*Erysiphe polyphaga*, *Erysiphe fuliginea*, *Erysiphe oronti*, *Sphaerotheca fuliginea*).
Dosering: 70 g/ha; 2-12 toepassingen met een interval van 7-10 dagen.
Max. 12 toepassingen per teelt.

GARANTIE:
Des examens approfondis ont démontré que le produit, si utilisé conformément à nos instructions, convient aux utilisations décrites. Toutefois, comme la conservation, la manutention, le transport et l'usage échappent à notre contrôle, et d'autant plus qu'il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus et/ou aux endommagements qui surviendraient suite à la conservation, la manutention, le transport ou l'usage du produit. Nous garantissons uniquement la qualité constante du produit fourni. En cas de doute ou d'incompréhension quant aux utilisations décrites du produit sur des cultures nouvelles et/ou inhabituelles, sur de nouvelles races etc., veuillez nous contacter d'avance afin d'obtenir de plus amples informations.

Emballages vides et surplus de traitement
L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Emballages vides et surplus de traitement
L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.